

シメ之ニ依的兒四百「グラム」ヲ數回ニ分チテ注入スヘシ然ルトキハ三十分乃至四十五分後ニ日本蠟ハ沈澱物トナリテ分離スヘキナリ於此之ヲ濾紙上ニ集メ依的兒ニテ洗ヒ之レガ熔融點ヲ檢シ以テ之ヲ精檢スヘシ

○蓖麻子油ノ惡味ヲ消ス法

(Pharm. Centralh. 1896. Nro 26, 397.)

(田原)

シリヤ國ノ或ル醫師ガアラビヤ人ニ習ヒタリトテ報告シタル變味法ヲ見ルニ蓖麻子油一五乃至二〇「グラム」ヲ一碗ノ牛乳ニ和シ絶ヘス攪拌シナカラ温ムレハ數分時間後ニハ完全ニ乳劑ニ變スヘキガ故ニ今之ニ橙花舍利別少許ヲ加フレハ美味ニシテ効能原品ニ讓ラサル製劑トナルヘシ
序ニ他ノ一良法ヲ述ヘ世ノ注意ヲ乞フニ蓖麻子油ヲ黑麥酒ト共ニ壺内ニ於テ善ク振盪スルカ或ハ杯内ニ於テ善ク攪拌スレハ極メテ服用シ易キ油トナル

雜 録

○陀洹兒散ノ原處方書

(Pharm. Centralh. 1896. Nro 27, 420)

(田原)

瑞西國醫事通信新聞ノ記事ニ據レハ陀洹兒散ノ原處方書ハ發明者陀洹兒氏之ヲ其著書「Ancient physicians Legacy」ニ記入セリ其原文ニ曰ク

阿片

一匁

硝石

各々四匁

酒石英

吐根

一匁

加熱以テ紅熾ニ達セシメタル乳鉢内ニ酒石英ト硝石トヲ投シ匙ヲ以テ混和シ燒燼スルニ至ラシメ
其上ニ阿片末ヲ粉碎シ混和スヘシ

○柔皮及帶革塗料

(Pharm. Centralh. 1896, Nro 28, 343.)

(田原)

柔皮及帶革ニ適スル塗料ノ一種其製法左ノ如シ

黃色「セレン」Gelbes Ceresin

一・〇分

粗製棧欄子油

一・〇分

豚脂

五・〇分

右三品ヲ熔合シ其熔合物稠度ノ厚薄及季節ノ寒暖ニ從ヒ通常華攝林油四乃至六分ヲ混和スヘシ

○「ピクリンゲラチン」Pikringelatine.

(Int. photogr. Monatschr. f. Medizin etc.)

(田原)

必偏林酸安母尼亞ヲ和シタル「ゲラチン」ハ重格羅謨酸加留謨ヲ和シタルト同シク日光ニ觸レシムレ